bres présents. M. Friedel rappelle que M. Viguier a signalé un cas semblable chez la même plante.

M. Gagnepain donne lecture de la Note ci-dessous de M. de Boissieu.

Note sur une Violariée nouvelle de l'Indo-Chine française;

PAR M. H. DE BOISSIEU.

Les collections de Violariées indo-chinoises qui nous ont été obligeamment communiquées par le Muséum d'Histoire naturelle de Paris en vue de la Flore de l'Indo-Chine française, ne nous ont fourni qu'un nombre très restreint d'espèces de cette famille cependant largement répandue dans l'Asie tropicale¹. Les genres Viola, Ionidium, Alsodeia, ne renfermaient aucune espèce nouvelle. Par contre, nous avons déterminé une seconde espèce d'un petit genre jusqu'ici monotypique et confiné dans l'île de Ceylan, le genre Scyphellandra Thw.

Ce genre, dont beaucoup d'auteurs ont fait une division du genre Alsodeia, est placé assez loin de ce dernier par Bentham et Hooker dont nous partageons complètement l'avis. Il diffère nettement du genre Alsodeia par la nature du disque, développé en cupule continue chez les Alsodeia, et au contraire réduit chez les Scyphellandra à cinq petites écailles séparées. En outre, dans les Scyphellandra, les étamines sont munies sur le dos d'une écaille minuscule en forme de petit grain d'orge qui fait généralement défaut dans les Alsodeia et manque en particulier aux Alsodeia de l'Indo-Chine française.

Nous décrivons ci-dessous cette espèce nouvelle:

Scyphellandra Pierrei sp. nov.

Frutex ramis longis, erectis, pubescentibus. Folia subsessilia, inferiora fasciculata, superiora alterna, breviter petiolata, ovata vel ovato-oblonga, denticulata, glabra. Flores solitarii vel in fasciculis brevibus axillaribus. Pedicelli breves, tenues. Sepala ovato-ovoidea. Petala oblonga, acutiora, sepala 2-plo superantia. Stamina squamula graniformi dorsali brevissima

^{1.} Note ajoutée pendant l'impression. — Au moment où nous écrivions ces lignes, nous n'avions pas encore examiné les herbiers Thorel et Pierre.

prædita stamine 6-10-plo breviore, anthera 4-plo breviore, appendice connectivum terminante anthera duplo longiore, petala staminibus (cum appendicibus) æqualia vel iis viæ longiora. Stylus longus; stigma vix stipitatum; capsula oblonga, valvis apiculatis.

Jardin botanique de Saïgon (Talmy); delta du Mé-Kong (Harmand). Le Scyphellandra virgata Hook. et Thw. (in Flora of Ceylan de Triman et in Flor. Br. Ind., I, 189, sub Alsodreia) diffère de notre espèce: par les étamines qui (y compris l'appendice) sont deux fois plus courtes que les pétales et non égales ou subégales à ceux-ci; par les appendices terminaux égaux aux anthères et non deux fois plus longs qu'elles; par l'écaille graniforme dorsale égale généralement à la moitié de l'anthère ou au moins à son tiers; enfin par le stigmate plus divisé et par la capsule plus courte.

La Flore de Ceylan de Triman donne une excellente figure du Scyphellandra virgata.

M. Gagnepain fait ensuite la communication suivante :

Nouveautés asiatiques de l'herbier du Muséum (I. Hydrocharitacées, II. Ménispermacées, III. Lardizabalées);

PAR M. F. GAGNEPAIN.

I. — Une hydrocharitacée nouvelle.

Dans la séance du 25 octobre dernier, p. 542, je décrivais, sous le nom d'Oligolobos, un genre nouveau d'Hydrocharitacées, renfermant une espèce originaire du Tonkin, l'O. Balansæ. Par suite d'un envoi récent, une seconde espèce, récoltée au Kouy-tchéou par le P. Cavalerie, étend l'aire de ce genre et précise ses caractères, en montrant dans quel sens varient certains d'entre eux et quels sont ceux qui demeurent fixes étant communs aux deux espèces.

Oligolobos triflorus Gagnep. sp. n.; ? Boottia sinensis Lévl. et Vant, nom. nov., in Fedde Repertorium nov. spec. (1908), p. 10; ? Ottelia sinensis Lvl. 1.

1. Au moment de mettre en pages, j'ai connaissance seulement de cette synonymie. La description insuffisante de Mgr Léveilléne permet pas d'identifier les deux plantes : elles ont le même n° de collecteur, la même date et ont été récoltées dans la même localilé; c'est tout ce que je puis affirmer.